



Nach Eingliederung einer Krone oder Brücke

Glückwunsch!

Sie haben sich zur Wiederherstellung eines Zahnes bzw. zu einem festsitzendem Zahnersatz entschieden.

Nach Abschluss der Behandlung eines natürlichen Zahnes

Im Allgemeinen ist ein erkrankter Zahn, welcher eine entsprechende Behandlung erfahren hat risikobehafteter als ein vollständig gesunder Zahn.

Im Falle einer Überkronung stellt eine erneut auftretende Karies das Hauptrisiko für die prothetische Arbeit dar. Auch eventuell erneute Zahnfleischerkrankungen können ein Risiko bedeuten. In jedem Fall kann durch entsprechende persönliche Massnahmen einem Misserfolg entgegengewirkt werden.

- ▀ *Verstärken Sie maximal die Hygienemaßnahmen* in der behandelten Zone
- ▀ *Benutzen Sie eine Interdentalbürste mindestens 1 mal pro Tag* zwischen dem festsitzenden Zahnersatz und den Nachbarzähnen.
- ▀ *Spülen Sie täglich* den Bereich unter einem Brückenglied. Sie können hierzu eine medizinische Spritze oder eine Munddusche benutzen.
- ▀ *Die regelmäßige Nachkontrolle bei Ihrem Zahnarzt* ist massgeblich entscheidend für die langfristige Aufrechterhaltung des Behandlungserfolges.
- ▀ *Applizieren Sie alle 2-3 Monate während 1 Woche mit Hilfe einer Interdentalbürste ein fluoridhaltiges Gel in den Zahnwischenräumen.*