



À la suite d'une *pose de couronne ou de bridge dentaire*

Félicitations !

Vous avez opté pour le remplacement d'une ou plusieurs dents.

Lorsque le traitement a été effectué sur

Implant(s)

En présence d'implant, le risque de carie n'existe pas. Attention, il reste toutefois présent sur les dents adjacentes, c'est pourquoi l'hygiène doit être maintenue. C'est plutôt les atteintes de la gencive qui menacent la couronne ou le bridge sur implant. Afin de prévenir une complication, nous vous recommandons de :



Renforcez l'hygiène au minimum dans la zone traitée.



Ajoutez le passage d'une brossette 1 fois par jour au moins entre les dents adjacentes à la restauration



Sous un bridge, ***effectuez un rinçage quotidien***. Vous pouvez utiliser une seringue remplie d'eau ou d'un bain de bouche.



Le suivi chez votre médecin dentiste est essentiel au maintien de la situation à long terme.



Un arrêt ou une diminution significative d'un tabagisme améliore le pronostic à long terme d'un implant



Durant 1 semaine tous les 2-3 mois, vous pouvez ***effectuer une cure de bain de bouche à la Chlorhexidine*** (en pharmacie : 20 ml à 0.2 % durant 60 sec., recracher sans rincer). Ne pas utiliser le produit en permanence.